

Další omezení platí při léčbě onkologických pacientů. Po společné dohodě se **Aloe Vera** neužívá den před chemoterapií a v samotný den její aplikace. Po zbytek období je užívání **Aloe Vera** naopak žádoucí. Omezení v užívání během chemoterapie neplatí pro **Colostrum** ani pro **Reishi**.

Aloe Vera a **Colostrum** nedoporučujeme podávat souběžně s imunomodulanti (Bronchovaxom, Luivac, Ribomunyl...), neboť není ověřeno, jak mohou na organismus společně reagovat. V neposlední řadě platí, že se nedoporučuje podávání **Colostru** dětem s alergií na kravské mléko (pokud je řádně stanovená), na léčení atopického ekzému nebo dlouhodobé nemoci, pro možnou přítomnost stopového množství bílkoviny kravského mléka. Toto množství by stačilo k vyvolání alergické reakce.

Těhotenství a kojení s sebou nese také určitá omezení v používání našich produktů, ale každopádně menší, než zákaz klasických farmak. Platí, že gravidní žena, obzvláště taková, která opakovaně potratila, nemůže během těhotenství užívat **Aloe Vera** (zvýšeně prokrvuje dělohu). **Aloe Vera** se také neužívá v době kojení, a to ze zcela jednoduchého důvodu – toxiny a nežádoucí látky, které se z těla matky uvolňují při podávání Aloe, se přirozeně dostávají do mateřského mléka a dítě by tyto „nečistoty“ zbytečně pilo. Výsledkem pak může být rozvoj atopického ekzému či opakované nemoci. **Colostrum** a **Vitaaktiv** lze brát naopak v graviditě bez omezení.

ROČNÍ OBDOBÍ

Jednotlivá roční období mají na užívání LR produktů velký vliv. Je to z důvodu typických sezónních onemocnění. Na podzim a v zimě je to období respiračních infekcí a chřipek (**Colostrum**, **Cistus incanus**, **Aloe Vera gel**), na jaře dominující alergie (**AV Spray první pomoci**, **Aloe Vera gel**), v létě průměrná onemocnění (**Colostrum**, **Probiotic 12**) a nepříznivé vlivy slunečního záření (**AV Spray první pomoci** a **AV Koncentrát**). Přesto můžete celou řadu našich produktů užívat neomezeně v průběhu celého roku.



DOPORUČENÍ PRO NEJČASTĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ A CHOROBNÉ STAVY

PŘÍPRAVA PŘED OPERAČNÍM VÝKONEM:

Aloe Vera Peach (nebo **Honey** či **Freedom**) – 1 ml/kg váhy rozděleno na 2 denní dávky, podávání zahájit 2 týdny před operačním výkonem na celkovou dobu 3 měsíců. Výběr Aloe přizpůsobit druhu operace.

Colostrum Compact – 2x1–2x2 kapsle – dle stavu a infekčnosti pacienta, zahájit 2 týdny před operačním výkonem na dobu 1 měsíce.

ATOPICKÝ EKZÉM:

Celkově – **Aloe Vera Peach** – 1 ml/kg rozděleno na 2 denní dávky. Na tuto dávku se dostat během měsíce postupně. Vzor postupného zvyšování dávek pro hmotnost 16 kg – první týden 2x2 ml, od 2. týdne 2x4 ml, od 3. týdne 2x6 ml, od 4. týdne 2x8 ml – obdobně si vypočítáte navýšení dávky s hmotností Vašeho klienta.

Lokální aplikace – na vlhkou, infikovanou, mokvavou, rozpraskanou, kůži – **AV Koncentrát** nebo **AV Spray první pomoci 2–3x denně**, na suchou, jemně se šupinkující, olupující se kůži – **AV Dětské ošetřující mléko 2–5x denně**, nebo **Aloe Vera Krém s propolisem 2x denně**.

Souběžně s tím je nutná i úprava stravy dle výsledků alergologického vyšetření.

AKNÉ

Celkově – **Aloe Vera gel (Peach** nebo **Freedom**) 1 ml/kg rozděleno na 2 denní dávky – na tuto dávku se dostat během 2 týdnů postupně. Vzor postupného zvyšování dávek pro hmotnost 30 kg – prvních 5 dnů 2x5 ml, druhých 5 dnů 2x10 ml, dále pak 2x15 ml – obdobně vypočítejte pro hmotnost svého klienta.

Colostrum compact 2x2 kapsle – při zánětlivé aktivaci akné nebo při akutní infekci.

Lokální aplikace – na velké plochy – aktivovaného zaníceného akné **AV Spray první pomoci 2–3x denně**, na malé plochy **AV Koncentrát 2–3x denně**.

Na obličej s akné – na noc aplikovat pleťovou masku z **AV Koncentrátu**, během dne 2x denně otřít kůži tamponem s **AV Sprayem první pomoci**. Alternativou jsou i produkty **Microsilver Plus**.

OPAKOVANÁ NEMOCNOST – VE ŠKOLCE

Aloe Vera Peach – 1 ml/kg rozděleno na 2 denní dávky + při obtížích lokálně do krku aplikovat **AV Spray první pomoci** nebo **Cistus Incanus spray (4–6x denně)**.

Při akutním respiračním infektu (chřipka, teploty) přidat **Colostrum Direct až 3–4x denně**, dle stáří dítěte a vypracované tabulky (viz článek v předchozím LR Magazínu).

Pro dlouhodobou prevenci lze eventuálně doplnit **Colostrum Compact 1 kapsle denně** nebo **Vita Aktiv 1x5 ml** (po domluvě s lékařem).

CROHNOVA CHOROBA, ULCERÓZNÍ COLITIDA:

Aloe Vera gel (Honey nebo **Peach**) – 1 ml/kg rozděleno na 2–3 denní dávky, **Probiotic 12** – 1x1 kapsle denně – obojí dlouhodobě, **Colostrum Compact 2x2 kapsle** (vždy při zhoršení stavu základního onemocnění nebo při infekčním onemocnění).