



LR PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY - C-D

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Vážení LR-partneři

Všechny Vás zdravím a doufám, že díky lékařským stránkám LR Magazínu získáte další užitečné tipy k efektivnímu použití LR produktů a najdete odborné informace, které můžete vzápětí předat svým zákazníkům. Díky Vaší zpětné vazbě z Infolinky a elektronické pošty vím, že pro kontakt s klienty považujete tyto informace za velmi užitečné, proto se snažím pokračovat v dalších základních chorobách podle abecedního seznamu. Zde jsou.

C

• Cirhóza jater

Jedná se o chronické jaterní onemocnění vznikající při poškození virovou infekcí či při nadměrném poškození organismu alkoholem apod. Jeho vlivem v játrech dochází k přeměně jaterní tkáně a cévního řečiště na vazivo. K cirhóze jater může vést také porucha žlučovýchodů nebo srdeční městnání, to jsou ale méně časté případy. Tato nemoc připomíná chronický zánět jater, nemocní však mají nespecifické příznaky. Může se dostavit žloutenka až ascites (tekutina) v dutině břišní. Pacienti někdy pociťují bolesti břicha, cítí únavu, vyčerpání, tvoří se jim jícnové varixy a otoky DK. Může dojít také k poškození mozku, selhání ledvin, nezřídka k úmrtí.

Terapie: Nutné je odstranění příčiny poškození jater, správná životospráva, dieta, někdy i transplantace jater. Zásadní je podpora funkce jaterní tkáně.

Podpora terapie produkty LR: **Aloe Vera Med** či **Broskev** k detoxikaci organismu, podpoře a regeneraci jaterní buňky a sekrece žluči. **Probalance** k odkyselení organismu (pH moči by se mělo ustálit kolem pH7). **Colostrum** (dle stavu jater) nejméně 2x2 tobolky (případně více) k regeneraci jaterní buňky (zvláště při poškození jaterní buňky virem).



• Crohnova choroba

Chronické zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí, nejspíše autoimunního charakteru. Nemoc je ovlivněna geneticky, je však možné vyvolat ji vlivy okolního prostředí (strava, kouření, hormonální antikoncepce, stres a mnoho dalších příčin).

Může se jednat o stenozující (zužující se) typ choroby, vznikající při zánětu střeva, nebo o fistulující (píštělovitý) typ choroby, kdy zánět vzniká slepením střeva a vytvořením píštělí mezi kličkami. Zánět je přitom omezen pouze na stěnu střeva.

Onemocnění se projevuje křečovitými bolestmi střeva, průjmy, teplotami, krví ve stolici se svěděním konečníku a okolí, píštělemi konečníku, postižením žaludku či žlučovýchodů, bolestmi kloubů, kožními změnami atd.

Terapie: Podávání protizánětlivých léků, kortikosteroidů a léků potlačujících imunitu, jako je biologická terapie ATB. Někdy je nutná také operační léčba.

Podpora terapie produkty LR: Vhodné je nasazení správných bakterií do střeva a podpora imunitního systému, tedy nasazení **Probiotic12** po dobu 1–2 měsíců, **Aloe Vera Med** či **Broskev** (dlouhodobě, nejméně 1 ml/kg váhy). **Probalance** k odkyselení organismu (pH moči by se mělo ustálit kolem pH7). **Colostrum Compact** 3x2 tobolky, případně více (při zhoršení stavu, zhoršení průjmů či při infekci). Zcela nezbytná je také úprava stravy a životosprávy. Vzhledem k tomu, že při nemoci často dochází ke stresům, únavě a dotyčným chybí železo, je vhodný také **Mind Master Red** 80 ml/den.

