

H

• Hemoroidy

Nebo také hemeroidy, křečová žíla konečníku a podobně.

Má je téměř každý, ale ne všichni pociťují potíže. Jedná se o onemocnění cévní pleteně v oblasti konečníku, v níž drobné tepénky přivádějí krev a drobné žilky ji odvádějí. Jakmile dojde k poruše uvedeného systému, žilky se rozšiřují a tvoří křečové žíly.

Vnější hemoroidy se vyskytují na zevním povrchu konečníku. V případě, že se nezanítí či neucpe odtok v žíle, nedělají obvykle problém.

Někdy tvoří pouze kožní řasu. Jakmile dojde k zánětu či krevnímu uzávěru, vznikají bolesti, problém s odchodem stolice a podobně. Oblast zevních hemoroidů je silně inervovaná a bolestivost je potom značná.

Vnitřní hemoroidy se tvoří hlouběji v konečníku. Jejich nejčastějším příznakem je krvácení (jasně červená krev na stolici či toaletním papíře). Tyto hemoroidy mohou krváčet i samovolně. Dalším příznakem může být i tzv. prolaps, což je vyhrznutí hemoroidů ven z konečníku. Při zatlačení může být i kolem konečníku hlen se stolicí. V tom případě mluvíme o tzv. „vlhké řiti“.

Terapie: konzervativní terapie spočívá v aplikaci mastí, sedacích koupelí, čípků a podobně. Podávají se tbl na zlepšení cévní stěny, dalším stupněm jsou ambulantní chirurgické zákroky a nakonec operace.

Podpora terapie produkty LR: podáváme dlouhodobě **Aloe Sivera**, která má velmi pozitivní efekt na cévní změny a záněty. Aloe také upravuje stolici, což je u hemoroidů velmi důležité. Na zevní hemoroidy můžeme opakovaně přikládat obklady s **Aloe Emergenci sprejem**, a to až několikrát denně. Zevní hemoroidy (a částečně i vnitřní) můžeme natírat 2–3x denně **Aloe Vera koncentrátem**. Pokud jsou největší potíže s vnitřními hemoroidy (otok, zánět, občasné krvácení a podobně), je možné aplikovat hlouběji do konečníku **Aloe Vera Koncentrát** (přímo, případně si v malé formičce z alobalu vytvořit v mrazničce čípky z **Aloe Vera Koncentrátu** a tyto 2x denně zavádět hluboko do kanálu konečníku).



• Hodgkinův lymfom

Neboli maligní lymfogranulom patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Začátek se většinou nachází v uzlině v podpaždí, odtud se šíří do okolí a celého lymfatického systému. Podle posledních výzkumů může jeho vznik souviset jeví s poruchou imunitního systému. Nejedná se o infekci.

Existují 4 stadia. Potíže typu zvětšených lymfatických uzlin, opakující se horečky, malátnost, únava, náhlé hubnutí, zvětšení sleziny, kašel, dušnost a jiné.

Terapie: chemoterapie je základní léčba. Někdy je kombinovaná s ozařováním.

Podpora terapie produkty LR: podáváme **Aloe Vera Broskev či Med** v dávce nejméně 2 ml/1 kg váhy. Zvláště vhodná je Aloe Vera jako podpora organismu při vedlejších účincích chemoterapie. Snižuje potíže typu nechutenství, únava, oslabená imunita, vznik aftů, moučnivky v dutině ústní /bílý povlak/ a podobně. Podporuje regeneraci poškozených mimonádorových tkání jako je kostní dřeň a podobně. Dutina ústní se může vyplachovat **Aloe Vera Emergenci sprejem**, který se dá i kloktat. Je možné přidat i **Colostrum** 3x2 tob k podpoře regenerace kostní dřeně. Místně je možné i použití **Aloe Vera Koncentrátu** na kůži, která může být od chemoterapie popálená. Podle pH moči přidejte **ProBalance** tak, aby byla moč kolem pH 6,5–7. Při velkém rozsahu nemoci je možné přidat **Reishi**, nejméně 2x2 tob k posílení protirakovinných produktů.

