

Endometriózu dělíme na:

Peritoneální (pobřišníční), kdy se ložiska endometriózy v době menstruace odlučují a vede to k místnímu zánětu a později k jizvě na pobřišnici i k defektům.

Ovariální (vaječnicková) endometrióza je charakteristická výskytem barevných ložisek na povrchu vaječníku, které se mohou vnořit do hloubky vaječníku a vytvořit cystu velikosti i několika centimetrů.

Endometrióza rektovaginálního septa (přepážka mezi pochvou a konečníkem) – pro tento případ je charakteristický výskyt tuhých uzlíků. Uzlíky se mohou tvořit i ve svalovině pánevních orgánů. Tato endometrióza se v průběhu menstruačního cyklu projevuje trvalou a silnou bolestí.

Adenomyóza – projevuje se zvýšeným děložním krvácením, bolestivou a zvětšenou dělohou a dalšími příznaky (bolestivá menstruace, bolesti při pohlavním styku a dlouhodobá pánevní bolest). Velmi častá je i neplodnost.

Terapie: často chirurgická, laparoskopická, kdy je snaha o odstranění ložisek endometriózy. Hormonální (zde je často recidiva). Někdy jsou nutná i antidepresiva. Pokud je to možné, doporučuje se otěhotnění, aby se přerušil přirozený hormonální cyklus.

Podpora terapie produkty LR: je potřebné podpořit imunitní systém pomocí **Aloe Vera Broskev**, nejméně 1,5 ml/1 kg váhy, přidat **Reishi** nejméně 3x1 tob. a **Omega 3** 3x1 tob. Velmi dobré je přidat **Probalance** k podpoře odkyselení (pro pH kolem 6,5–7).



G

• Gangréna

Gangréna neboli sněť je velmi vážné onemocnění, které ohrožuje i život nemocného. Podstata je v nedostatečném cévním zásobení tkáně kyslíkem a živinami. Proto tato tkáň odumírá. Anaerobní bakterie, které nesnášejí kyslík, se v ní rychle množí a ohrožují život.

Příčina: dochází k ní při zúžení nebo poškození cévního zásobení – nejčastěji při zranění nebo při ischemické chorobě dolních končetin, často ale také při cukrovce a při kouření. Při cukrovce vzniká tzv. diabetická noha.

Typy gangrén: suchá – začne odumírat tkáň bez výživy, ale je ještě bez infekce;

vlhká – zapáchající tkáň, která je již napadena bakteriemi a dochází k jejímu rozpadu;

plynatá – zvláštní typ, kdy bakterie typu clostridií napadenou tkáň rozežirají a vytvářejí plynaté zplodiny a toxické látky – třaskání plynu ve tkáni. Jde o smrtelnou komplikaci.

Terapie: u suché gangrény se tkáň chrání, aby nebyla napadena infekcí, potom se amputuje ta část tkáně, která již nemá šanci se zhojit. U ostatních gangrén jsou nutné vysoké dávky ATB, místně agresivní terapie, často i amputace uvedené tkáně, někdy jde o život zachraňující výkon.

Podpora terapie produkty LR: nejlépe je začít prevencí před chorobami, při nichž se zužují cévy. Cukrovka, ischemické choroby DK i srdce, ateroskleróza apod. Podáváme dlouhodobě **Aloe Vera**, nejlépe **Siveru**, pokud však pacient používá k léčbě **Warfarin**, volíme **Med** nebo **Broskev**! Přidáváme **Probalance** k odkyselení organismu, protože kyselost prostředí v tkáni má negativní účinek na cévní systém.

Velmi vhodné jsou opakované kúry pomocí **Vitaactiv**. Při rozvoji choroby a léčbě ATB přidáváme **Probiotic 12** (nejméně 2 měsíce) a **Colostrum** (podle akutnosti stavu) **Direct** (4x15ml), nebo **Compact** (nejméně 3x3 tob.). Místně k doléčení po zvládnutí akutní infekce používáme na ránu **AV Emergency sprej** a **AV Koncentrát** (několikrát denně).



Pokračování na následující straně ►