

Může se projevit na kůži, na sliznici dutiny ústní i na jiných místech. U pacientů s AIDS je agresivnější a může se objevit i na jiných orgánech, nejčastěji na plicích. Jedná se o nádorově zvrhlé buňky krevních cév a kapilár. Projevuje se zarudlými až fialovými skvrnami s uzly, které se následně šíří do okolního vaziva. U břišního typu hrozí i vykrvácení. **Terapie:** v současné době je na vyšší úrovni než v minulosti. Pacient je v léčbě onkologa a velmi záleží na rozšíření onemocnění a na stavu imunitního systému.

Podpora terapie produkty LR: základem podpory terapie je podávání **Colostrum Direct** (nejméně 3x10 ml; později je vhodné přejít na **Colostrum Compact** (3x3 tob.). Dále, protože se jedná o virovou infekci, je možné přidání **Cistu Incanu** (3x1 tob.). Častá je také terapie pomocí chemoterapie (v případě LR produktů postupujeme jako při chemoterapii a přidáváme **Aloe Vera** v dávce 2 ml/kg váhy, kromě dne samotné chemoterapie). Doplňme **Probalance** podle pH moči (aby byla kolem 6,5–7). Neméně důležité je přidat **VitaAktiv** (10 ml denně) k podpoře organismu a imunity.



• KAWASAKIHO NEMOC

Jde o multisystémové zánětlivé onemocnění postihující malé a střední arterie (jde o vaskulitidu neznámé etiologie). Nejčastější je u dětí do 5 let. Projeví se často náhlou vysokou horečkou, oboustranným zánětem očí, jahodově červeným jazykem, výrazným zduřením krčních uzlin, otoky malých kloubů, někdy i bolestí břicha, žlučníku a řadou dalších možných příznaků. Diagnózu stanovuje lékař.

Terapie: podávání imunoglobulinů do žíly, Anopyrin ve vyšších dávkách, případně kortikoidy při selhání uvedené terapie.

Podpora terapie produkty LR: vzhledem k zánětu nejasné etiologie se podávají vysoké dávky **Colostrum Direct** (dávkování podle váhy dítěte), dále dlouhodobě **Aloe Vera Med** či **Broskev** (1,5 ml/1 kg váhy) a **VitaAktiv** (5 ml/den).



• KŘEČOVÉ ŽÍLY

Křečové žíly neboli varixy jsou nejčastějším žilním onemocněním. V evropských zemích jsou z 20–30 % záležitostí mužů a z 40–50 % záležitostí žen. Jde o povrchní žilní systém na dolních končetinách, ve kterém se z různých důvodů projevuje nedostatečnost chlopního systému. Ten má spolu se svalovou pumpou napomáhat návratu krve směrem k srdci.

S tímto postižením se člověk již rodí. Je ovlivněno geneticky, případně se postupně vyvíjí, a to z různých důvodů. Následkem přetlaku v žilním systému dochází ke zvětšování průměru žil a vzniká obraz žilní nedostatečnosti. Vznikají viditelné křečové žíly v podkoží, bolestivost dolních končetin a pocit těžkých a unavených nohou. Objevují se kožní změny a někdy i kožní vředy (viz písmeno B – LR Magazin 2/2014).

Někdy také mohou vznikat záněty povrchních křečových žil (povrchová flebitida) a ucpání (trombóza povrchových žil). Někdy může křečkový varix prasknout, čímž vzniká poměrně velké krvácení.

Terapie: varixy se léčí různými podpůrnými látkami s rutinou a podobně. Podle velikosti žilních varixů lze použít také skleroterapii a podpůrné bandáže či punčochy. Problém lze řešit také různým typem operací.

Podpora terapie produkty LR: vzhledem k oslabování žilní stěny a chlopní bych doporučil pít dlouhodobě **Aloe Sivera** (pokud neberete Warfarin), protože Sivera obsahuje vedle Aloe Vera také extrakt z kopřivy dvoudomé obsahující množství křemíku. Ten pozitivně působí na cévní stěny. K odkyselení organismu bych přidal také **Probalance** (dávkování podle pH moči). Při kyselosti tkání se totiž zvyšuje možnost žilní trombózy. Na stěnu žilní je možné lokálně aplikovat také **Aloe Vera Koncentrát**. Vhodný je zvláště při otoku a zarudnutí, tedy při počínajícím zánětu povrchových žil. Pokud jde o zánět, zde bych nasadil **Colostrum** (nejméně 2x2 tbl.) pro urychlení léčby. Je dobré využívat také cévní gymnastiku (po koupeli chvíli, asi 2 minuty, chodit či přešlapovat ve studené vodě). Potom nastříkejte na místa křečových žil **Aloe Vera Emergency spray** a vmasírujte jej do kůže.

